Anestesia e monitoraggio

◆ Paziente e attrezzature

Anestesia

- ◆ È quella branca della medicina che si occupa di annullare la sensibilità dolorifica e la coscienza durante una procedura invasiva o un intervento chirurgico

Anestesia e analgesia

- ◆ **Anestesia:** perdita di sensibilità di una parte o di tutto il corpo mediante soppressione reversibile controllata del sistema nervoso
 - ◆ Farmaco anestetico: farmaco che provoca anestesia
- ◆ **Analgesia:** insensibilità al dolore
 - ◆ Farmaco analgesico: farmaco che riduce la percezione del dolore senza causare la perdita di coscienza

- ◆ Anestesia e analgesia lavorano spesso in sinergia per garantire che un animale sottoposto a intervento chirurgico non subisca traumi durante e dopo un intervento.
- ◆ L'anestesia garantisce inoltre l'immobilità ed il contenimento del paziente

Ruolo dell'anestesista

- ◆ È responsabile del mantenimento di un livello di anestesia che:
 - ◆ Previene la consapevolezza del dolore
 - ◆ Fornisce immobilità
 - ◆ Induce amnesia
 - ◆ Rilassa i muscoli scheletrici
- ◆ Da qui si capisce l'importanza di una **anestesia bilanciata**

Ruolo del tecnico veterinario in anestesia

- ◆ Il tecnico veterinario svolge un ruolo importante nell'assistere il veterinario durante l'anestesia:
 - ◆ Cura e manutenzione dell'attrezzatura anestetica
 - ◆ Monitoraggio stretto e accurato del paziente prima, durante e dopo l'anestesia
 - ◆ Esecuzione di compiti specifici sotto la direzione e supervisione del veterinario

Fonti di rischio in anestesia

- ◆ Attrezzature
- ◆ Anestetici
- ◆ Anestesisti e operatori
- ◆ Reazioni impreviste
- ◆ Condizioni del paziente

Fasi dell'anestesia

- ◆ Valutazione del paziente
- ◆ Premedicazione
- ◆ Induzione
- ◆ Mantenimento
- ◆ Risveglio e analgesia postoperatoria

Valutazione del paziente

- ◆ Raccogliere una anamnesi completa del paziente
- ◆ Eseguire un esame fisico completo
- ◆ Esami del sangue di base (emocromo con formula, biochimico) a cui aggiungere altro in base alle necessità ed al tipo di intervento
- ◆ Raccogliere i referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite

3 - Anamnesi preoperatoria

- età, razza, sesso
- peso corporeo
- da quanto tempo si è verificato il problema?
- terapie farmacologiche in corso
 - organofosforici ⇒ potenziano l'effetto degli anestetici
 - antibiotici (aminoglicosidi, cloranfenicolo) ⇒ prolungano l'effetto del curaro
 - glicosidi cardiaci ⇒ bradicardizzanti
 - fenobarbital ⇒ metabolismo epatico aumentato per alcuni farmaci, per cui si può essere costretti ad aumentare la dose di barbiturici
 - FANS
 - calcioantagonisti ⇒ ipotensivi e bradicardizzanti
- segni di malattie sistemiche
 - diarrea
 - vomito
 - poliuria-polidipsia
 - convulsioni, alterazioni della personalità
 - intolleranze
 - tosse, rumori polmonari
 - perdita di peso, cachessia
- precedenti anestesie e/o allergie
- orario dell'ultimo pasto

ESAME OBIETTIVO GENERALE PREANESTETICO

- a. Peso e condizioni fisiche
 - a. Obesità
 - b. Cachessia
 - c. Disidratazione
- b. A. CARDIOPOLMONARE
 - a. Auscultazione
 - b. Suoni cardiaci e murmure
 - c. Rumori respiratori
 - d. Tempo di riempimento capillare
 - l. Colore delle mucose:
 - 1. Pallore
 - 2. Cianosi
 - e. Caratteri del polso
- c. SNC
 - a. Temperamento
 - b. Convulsioni - coma - stupore
 - c. Vista - udito
- d. A. GASTROENTERICO
 - a. Parassiti
 - b. Palpazione addominale
- e. S. EPATICO
 - a. Ittero
 - b. Alterazioni sanguigne
- f. A. RENALE
 - a. Palpazione di vescica e reni
- g. G-A. CUTANEO
 - a. Tumori
 - b. Infestazioni da pulci
- h. A. MUSCOLO-SCHELETRICO
 - a. Zoppie
 - b. Fratture

- ◆ Sarà raccolta l'anamnesi *remota e recente*
- ◆ In base alla valutazione di tutti i referti disponibili e all'EOG il veterinario stabilirà il protocollo anestesiological
 - ◆ Farmaci
 - ◆ Procedure
 - ◆ Attrezzature

Per garantire il massimo livello di sicurezza per il paziente e la massima tranquillità operativa al chirurgo

Valutazione in base alla razza

- ◆ Cani e gatti brachicefali —> maggiori problemi respiratori
- ◆ Predisposizioni di razza, es. Maine coon e cavalier King predisposti a patologie cardiache
- ◆ I Greyhound sono particolarmente sensibili ad alcuni farmaci in conseguenza della minor attività di un enzima epatico

Scala ASA

- ◆ La scala ASA (che prende il nome dalla società scientifica statunitense *American Society of Anesthesiologist*) è un prezioso strumento che consente di stabilire l'idoneità del paziente a subire un intervento chirurgico
- ◆ Prevede la valutazione dello stato fisico del paziente con conseguente classificazione in 6 stadi

Scala dello stato fisico dell'American Society of Anesthesiologists (ASA)

ASA I

Rischio minimo,
Animale sano, normale; nessuna malattia sottostante

ASA II

Leggero rischio, malattia minore presente
Animale con disturbo sistemico lieve; animale in grado di compensare

ASA III

Rischio moderato, presente malattia evidente
Animale con malattia sistemica moderata o disturbi; segni clinici lievi
Anemia, disidratazione moderata, febbre, soffio cardiaco lieve o malattie cardiache

ASA IV

Alto rischio, significativamente compromesso dalla malattia
Animali con malattia sistemica preesistente o disturbi di natura grave
Grave disidratazione, shock, uremia o tossiemia, febbre alta, malattie cardiache non compensate, diabete non compensato, malattie polmonari, emaciazione

ASA V

Rischio estremo, moribondo
Chirurgia spesso eseguita in modo disperato su animali con malattia sistemica pericolosa per la vita
Casi avanzati di malattie cardiache, renali, epatiche o endocrine, shock profondo, traumi gravi, embolia polmonare, neoplasie terminali

"E" denota emergenza

Consenso informato

- ◆ È un documento che attesta l'informazione e partecipazione del proprietario al processo decisionale
- ◆ vi è descritto
 - ◆ Iter diagnostico preparatorio consigliato
 - ◆ il tipo di procedura che sarà eseguita
 - ◆ Eventuali complicazioni
 - ◆ Eventuali variazioni della tecnica anestesiologicala

- ◆ Si informa il proprietario
 - ◆ della eventuale somministrazione di sangue omologo o autologo
 - ◆ Del trattamento antalgico peri e postoperatorio
- ◆ L'informazione del proprietario ha lo scopo di ottenere un consenso valido e consapevole
- ◆ Il documento deve essere datato e firmato dal cliente e dal medico

Digiuno

- ◆ È importante ricordarsi e chiarire al proprietario che è fondamentale un digiuno di
 - ◆ 8-10 ore in un animale adulto
 - ◆ 3-4 ore paziente pediatrico (di più rischio di ipoglicemia)
- ◆ per non incorrere in
 - ◆ Vomito
 - ◆ Polmonite ab ingestis

Acqua

- ◆ Può rimanere a disposizione fino a 2 ore prima della chirurgia
- ◆ Attenzione a non lasciare disponibile la ciotola piena, ma solo un fondo di ciotola (un paio di dita)

Premedicazione

- ◆ La premedicazione mira a:
- ◆ Mitigare l'apprensione
- ◆ Somministrare l'analgesia
- ◆ Facilitare la contenzione
- ◆ Fornire neuroleptoanalgesia
- ◆ Ridurre i dosaggi degli agenti anestetici e minimizzarne gli effetti negativi
- ◆ Migliorare la qualità del risveglio

- ◆ Normalmente consiste in una combinazione di classi di farmaci
 - ◆ Sedativi e tranquillanti
 - ◆ FANS
 - ◆ Oppioidi
- ◆ Può essere somministrata per via intramuscolare o endovenosa in associazione a analgesici generali o locali

Sedativi e tranquillanti

- ◆ Tranquillante: (es. Acepromazina)

- ◆ Calmante

- ◆ Rilassamento muscolare

- ◆ Sedativo: (es. Dexmedetomidina)

- ◆ Calmante

- ◆ Rilassamento muscolare

- ◆ Analgesia

L'effetto calmante è dosedipendente

Acepromazina (prequillan)

- ◆ Antiemetico
- ◆ Antistaminico
- ◆ Antiaritmico
- ◆ Ottimo miorilassante
- ◆ Abbassa la soglia delle convulsioni
- ◆ Riduce l'ematocrito per sequestro di globuli rossi a livello splenico
- ◆ Inibisce la termoregolazione
- ◆ Causa profonda vasodilatazione con conseguente ipotensione
- ◆ Pazienti geriatrici e di grossa taglia tendono ad essere più sensibile e richiedono un dosaggio minore

Dexmedetomidina

- ◆ È un alfa-agonista altamente selettivo che consente:
 - ◆ Sedazione
 - ◆ Analgesia
 - ◆ Miorilassamento
- ◆ Effetti collaterali
 - ◆ Iperglicemia
 - ◆ Aumento della diuresi
 - ◆ Limitati effetti sul sistema cardiocircolatorio e respiratorio

Benzodiazepine (es. Diazepam, Midazolam)

- ◆ Non danno analgesia
- ◆ È consigliabile utilizzarli in associazione con oppioidi o alfa2-agonisti
- ◆ Garantiscono un buon rilassamento, ma da soli possono scatenare fenomeni eccitativi o disforici in animali giovani e in salute
- ◆ Agiscono a livello di SNC su recettori specifici
- ◆ Possono essere antagonizzati con l'antidoto specifico

◆ Diazepam

- ◆ Somministrata ev troppo rapida può causare bradicardia, ipotensione, apnea
- ◆ Può essere miscelato in siringa solo con la ketamina
- ◆ Non può essere lasciato in siringa a lungo
- ◆ Durata d'azione 2-3 ore

◆ Midazolam

- ◆ Più potente del diazepam
- ◆ Può essere miscelato con altri sedativi e anestetici nella stessa siringa
- ◆ Durata d'azione circa 2 ore

Oppioidi

- ◆ Si possono utilizzare in
 - ◆ Premedicazione
 - ◆ Induzione
 - ◆ Analgesia (sono i più efficaci)
- ◆ Nella premedicazione produce un'analgesia preventiva e consente una riduzione delle dosi di anestetici da utilizzare
- ◆ L'antidoto è il naloxone

Meccanismo d'azione

- ◆ Si legano a recettori specifici a livello centrale e periferico
 - ◆ *Mu*: analgesia soprasspinale e spinale, euforia, depressione respiratoria, miosi, bradicardia, ipotermia
 - ◆ *Kappa*: analgesia spinale e sovraspinale, miosi, modesto stato di sedazione, disforia, lieve grado di depressione respiratoria, effetti stimolanti vasomotori
 - ◆ *Delta*: eccitazione, ipercinesia, euforia, allucinazione, analgesia periferica, depressione respiratoria, midriasi, mediano e potenziano l'analgesia provocata dagli agonisti *mu*
 - ◆ *Sigma*: non sembrano strettamente correlati con l'analgesia
- ◆ I neuroni diventano non ricettivi agli stimoli eccitatori e bloccano la neurotrasmissione (analgesia e sedazione)

◆ Classificati come:

◆ Agonisti puri

◆ Farmaci morfina-simili capaci di legarsi principalmente ai recettori *mu*

◆ Morfina, fentanil, metadone, meperidina, codeina, carfentanil, ossimorfone

- ◆ Agonisti-antagonisti e agonisti parziali

- ◆ Farmaci che mostrano azioni miste, ossia agonisti nei confronti di certi recettori e antagonisti nei confronti di altri o solo attività limitata e debolmente agonista
- ◆ Butorfanolo, agonista verso i recettori *kappa* e *delta* e agonista verso i recettori *mu*
- ◆ Buprenorfina, agonista parziale nei confronti dei recettori *mu*, e antagonista nei confronti dei recettori *kappa*

◆ Antagonisti

- ◆ Sono gli oppiacei che occupano il recettore ma non attivano la traduzione del segnale, ossia non provocano alcun effetto
- ◆ In realtà sono agonisti molto deboli, a dosaggi altissimi possono manifestare effetti
- ◆ Naloxone, naltrexone, e diprenorfina con azione rivolta soprattutto ai recettori *mu* e in maniera molto limitata verso i recettori *delta* e *kappa*

Effetti

- ◆ Analgesici
- ◆ Sedativi ed eccitatori —> effetti sedativi fino a perdita di coscienza in alcune razze (cane, coniglio) . Fenomeni di ipereccitazione dose dipendenti nei gatti
- ◆ Su termoregolazione
- ◆ Sul sistema respiratorio —> sovradosaggio depressione respiratoria
- ◆ Sul sistema cardiocircolatorio —> vasodilatazione da rilascio di istamina a livello periferico e a livello centrale effetto inibitorio dell'attività cardiaca per gli agonisti dei recettori *mu* e effetto stimolante sul centrocardiocircolatorio per gli agonisti dei recettori *kappa*

- ◆ Su apparato gastroenterico —> aumento del tono degli sfinteri e riduzione della motilità in particolare a livello di grosso intestino
- ◆ Su apparato urinario —> azione antidiuretica e ritenzione urinaria
- ◆ Su riflesso della tosse
- ◆ A livello oculare —> miosi o midriasi
- ◆ Sul vomito —> stimolano il centro del vomito, apomorfina

- ◆ Sul sistema endocrino —> aumento della secrezione di prolattina e di ormone antidiuretico (ADH)
- ◆ Sul sistema immunitario —> immunosoppressivi
- ◆ Metabolici —> iperglicemizzanti

Neuroleptoanalgesia

- ◆ È una situazione di indifferenza al dolore e agli stimoli esterni in cui il paziente mantiene, almeno in parte, la capacità di collaborare
- ◆ Associazione di un agente neurolettico e di un narcotico e analgesico
 - ◆ **Oppioide + tranquillante**
 - ◆ **Morfina + acepromazina**
 - ◆ **Butorfanolo + midazolam**
 - ◆ **Butorfanolo + diazepam**
- ◆ Buona sedazione associata ad analgesia
- ◆ Contenimento chimico
- ◆ Può consentire intubazione in pazienti debilitati e critici

Induzione dell'anestesia

- ◆ Si procede all'induzione quando la sedazione ha ottenuto l'effetto desiderato
- ◆ L'obiettivo di questa fase è
 - ◆ anestetizzare rapidamente il paziente
 - ◆ Garantire la pervietà delle vie aeree con l'intubazione
 - ◆ Prevenire il vomito e/o rigurgito che potrebbero degenerare in polmonite ab ingestis

- ◆ I farmaci utilizzati per l'induzione sono:
- ◆ Propofol
- ◆ Tiopentale
- ◆ Ketamina
- ◆ Alfaxan
- ◆ Etomidato
- ◆ La scelta può variare in base alla familiarità del veterinario con i farmaci e i costi

- ◆ I segni clinici (incoscienza, rilassamento muscolare, perdita del tono mandibolare, risposta palpebrale, diminuzione della frequenza cardiaca e respiratoria) e gli stadi di anestesia sono gli stessi per questi farmaci
- ◆ Gli effetti sono legati a dose, concentrazione, e velocità di somministrazione

Tiopentale

- ◆ iniettato lentamente.
- ◆ Ha effetto rapidamente e viene smaltito rapidamente.
- ◆ Iniettato fuorivena causa necrosi dei tessuti
- ◆ Riduce compressione intracranica e convulsioni

Ketamina

- ◆ viene somministrata per via intramuscolare.
- ◆ Privilegiata quando si ha difficoltà a inserire un catetere venoso
- ◆ Solitamente associata a farmaci che ne mitigano gli effetti --> rigidità e spasmi muscolare, allucinazioni, delirio
- ◆ Analgesia somatica maggiore rispetto a quella viscerale

Propofol

- ◆ soluzione lattiginosa non solubile in acqua.
- ◆ Non contiene conservanti quindi di facile contaminazione.
- ◆ Somministrato solo per via endovenosa.
- ◆ Deprime il respiro.
- ◆ Ottima qualità di anestesia e di risveglio

Etomidato

- ◆ farmaco ipnotico a brevissima azione.
- ◆ Molto costoso.
- ◆ Non dannoso per i tessuti perivasali.
- ◆ Eliminato con metabolismo epatico

Alfaxan

- ◆ Neuroanestetico idrosolubile
- ◆ Viene metabolizzato rapidamente dal fegato
- ◆ Non provoca rilascio di istamina
- ◆ L'azione anestetica è dovuta al suo legame con i recettori GABA
- ◆ È un agente di induzione (paragonabile al propofol) con emivita molto breve
- ◆ Minimi effetti collaterali
- ◆ Può essere usato anche in CRI

Mantenimento dell'anestesia

- ◆ Consiste nel mantenere stabile il piano ipnotico durante l'intervento
- ◆ Si utilizzano prevalentemente agenti inalatori —> isoforane, sevoforane o infusioni continue (TIVA)
- ◆ Per ridurre la depressione cardiovascolare e respiratoria si riducono i dosaggi grazie all'uso di oppiacei

Agenti inalatori

- ◆ Consentono variazioni più veloci del livello di anestesia
- ◆ Minori rischi di sovradosaggio
- ◆ Minor accumulo
- ◆ Risveglio più veloce

Isoflurane

- ◆ I cambiamenti nella profondità dell'anestesia avvengono in circa 1-2 minuti
- ◆ Poco solubile nel sangue e ancor meno nel grasso → induzione e risveglio rapidi
- ◆ Molto ridotto il metabolismo epatico. Solo lo 0,2% viene assorbito
- ◆ Fornisce scarsa analgesia e moderato miorilassamento
- ◆ MAC 1,3% nel cane 1,6 nel gatto Di elezione in pazienti con patologie cardiache
- ◆ Irritante per le mucose

Sevoforane

- ◆ Induzione e risveglio più rapidi rispetto all'isoforane
- ◆ Non irritante per le mucose, consente quindi anche una eventuale induzione a maschera
- ◆ Nell'utilizzo con calce sodata ed in particolare ad alte temperature o quando la calce è particolarmente essiccata causa la formazione di composti A (con effetti nefrotossici) e B
- ◆ Decisamente più costoso dell'isoforane
- ◆ MAC 2,6% con 3-5% di prodotto assorbito e metabolizzato

	Effetto sul cuore	Effetto sulla respirazione	Rilassamento muscolare	Analgesia	Metabolismo
Isoflurane	Ipotensione minima a concentrazioni elevate	Lieve depressione	Buono	Minima	99% con la respirazione
Sevoforane	Ipotensione minima anche a concentrazioni elevate	Profonda depressione	Buono nei gatti, spesso scarso nei cani	Minima	97% con la respirazione

MAC - concentrazione alveolare minima

- ◆ Minima concentrazione alveolare di anestetico necessaria ad abolire la risposta motoria riflessa alla stimolazione chirurgica nel 50% dei pazienti (Saidman 1965)
- ◆ Corrisponde alla pressione parziale encefalica di anestetico alla quale si produce tale effetto
- ◆ Considerato per anni il *livello a cui condurre l'anestesia*

- ◆ Non è proprio così perché vale appunto per il 50% dei pazienti
- ◆ Sono stati valutati altri parametri
 - ◆ **MAC awake₅₀**, ossia la % a cui il 50% dei pazienti perde coscienza (Stoelting 1970)
 - ◆ **MAC awake 5**, ossia la % a cui il 95% dei pazienti perde coscienza. Più idoneo per la prevenzione del risveglio
 - ◆ **MAC espanso** o **MAC 95** abolisce la risposta motoria riflessa all'incisione della cute nel 95% dei casi (De Jong 1975)
 - ◆ **MACbar 50 e 95**, che da l'abolizione della risposta cardiovascolare adrenergica all'incisione cutanea nel 50 o 95% dei casi (blocco della risposta adrenergica) (Roize 1981)

- ◆ È un parametro di grande utilità che si riferisce al *mantenimento del livello chirurgico dell'anestesia*
- ◆ Tutto ciò fa capire che i soli alogenati non sono sufficienti (se non ad alte concentrazioni) per ottenere il controllo della risposta adrenergica al dolore
- ◆ L'evoluzione è stata l'anestesia *bilanciata* che prevede l'impiego contemporaneo di oppioidi che consente di ridurre moltissimo il MACbar
- ◆ Il MACbar è il valore a cui riferirsi per ottenere un *livello chirurgico*